



APLICACIÓN

Aplicación vía foliar, por sistema de riego o drench durante cualquier etapa de cultivo.

BENEFICIOS

- Aumenta la productividad.
- Fijación y estimulación de floración.
- Favorece el acondicionamiento y la estructura del suelo.
- Incrementa el intercambio catiónico.
- Activa los microorganismos del suelo.
- Excelente para desarrollo vegetativo.
- Anti-estresante.
- Estimulación de crecimiento radicular.
- Solubilización y conducción de fósforo a la planta.
- Estabilizador de pH.
- Prolonga la vida de anaquel del fruto en mercado.
- Mejora la apariencia del fruto.
- Potencializa el sabor del fruto.
- Mejora la calidad del cultivo.
- Estimula amacollamiento y crecimiento de la sepa.
- Gran aporte de microelementos.
- Gran aporte de nitrógeno.

COMPATIBILIDAD

Compatible con MBS, METARHIZIUM, BEAUVERIA BASSIANA, POWER ROOTS, HUMI-FULVI,

TRICHODERMA SPP y otros inoculantes. No compatible con productos alcalinos [pH>7].

MÉTODO DE PREPARACIÓN

(1) Agregar agua al tanque mezclador hasta la mitad de su capacidad. (2) Agitar el producto vigorosamente. (3) Abrir el envase del producto por la parte superior y vaciar la dosis adecuada. (4) Realizar el triple lavado del envase vacío agregando el água del enjuague directamente al tanque de aplicación. (5) Mezclar homogéneamente. (6) Completar el tanque con agua hasta el volumen final. (7) Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. (8) Preparar unicamente la cantidad de producto a aplicar. (9) Utilizar unidades con múltiplos de 200 L para cubrir uniformemente el follaje de la planta.






















DOSIS DE APLICACIÓN **POR CADA 200 LITROS**

5 L Hortalizas 5 L

5 L

5 L

Ornamentales

Frutales Caña de azúcar 10 L

Maíz 10 L

Granos y gramíneas 5 L Café 5 L

Forestales

CONTENIDO:

Nitrógeno Amoniacal 13.0 % Nitrógeno Ureico 16.0 % Ácidos Húmicos y Fúlvicos 10.0%





CONTRAINDICACIONES

No se aplique en horas de calor intenso (entre 11 am y 4 pm), cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/h) evitando el acarreo de la aplicación del producto a otros cultivos.No aplicar con suelos saturados o inundados, ni acuando acoscol luvia destre de la pariedado. cuando se espere lluvia dentro de un periodo de 6 horas después de la aplicación para no disminuir la efectividad

ALMACENAMIENTO

Manténgase en un lugar fresco y ventilado sin exposición directa al sol.

PRECAUCIONES

PRODUCTO NO APTO PARA CONSUMO HUMANO. Utilizar lentes y PRODUCTO NO APTO PARA CONSUMO HUMANO. Utilizar lentes y equipo de protección. No coma, beba o fume cuando esté utilizando el producto. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas y en lactancia. Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos. No use el producto sin el equipo de protección adecuado. No se ingiera, inhale y evite el contacto con los ojos y piel. EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDA AL MÉDICO Y APORTE ESTA ETIQUETA. En caso de vomito y marco, lleve al intoxicado con el médico. En caso de presentar lesiones en la piel, lleve al intoxicado con el médico. En caso de contacto con la piel y ojos, lave con



Prolongación Libertad 110 Col. Centro C.P. 94180. Ixhuatlán del Café, Ver.







